


LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN



La evolución de las bacterias. Papel de la simbiosis: El origen de los eucariotas; el origen de los organismos multicelulares



Las primeras células serían heterótroficas anaerobias
(teoría más aceptada)

Proteínas y ácidos nucleicos



- ✓ **Selección de rutas metabólicas**
- ✓ **Síntesis de energía química**



Actualmente, resultado de la Selección:

**Metabolismo
celular
altamente
organizado**





Cómo habrán sido las primeras rutas metabólicas





Metabolismo anaerobio

GLUCÓLISIS ANAERÓBICA



**VÍA METABÓLICA MÁS ELEMENTAL
Y PARTES DE LA MISMA SON
COMPARTIDAS POR TODOS LOS
SERES VIVOS**



Esta universalidad parece depender del hecho que:

***TODOS LOS ORGANISMOS VIVOS
OBTIENEN SU ENERGÍA LIBRE
DE LA DEGRADACIÓN QCA. DE
MONOSACÁRIDOS DEL TIPO DE
LA GLUCOSA***

HETERÓTROFOS: LOS MONOSACÁRIDOS
PROVIENEN DEL EXTERIOR

AUTÓTROFOS: MATERIALES ORG FABRICADOS
DENTRO DE LOS ORGANISMOS (reducción del CO_2)



La **glucólisis**, la **fermentación** y la **respiración**,
tiene una **base evolutiva**.

- ✓ es probable que los procariontes ancestrales emplearon la **glucólisis** (no requiere O_2) para sintetizar ATP...
- ✓ mucho antes que el O_2 estuviera presente en la atmósfera de la tierra (3500Ma hasta 2700Ma).
- ✓ Es la vía metabólica mas generalizada, lo que sugiere que evolucionó muy temprano en la historia de la vida.



Etapas evolutivas de la célula:

Modelo nutricional:

Autótrofo

fotoautótrofas



quimioheterótrofo



Modelo nutricional:


Heterótrofo


heterótrofo

Los procariontes adquirieron múltiples adaptaciones nutricionales y metabólicas durante la evolución

Estos **protobiontes** se diversificaron en una rica variedad de autótrofos, algunos de los cuales podían utilizar la energía de la luz.

PROBABLE ASPECTO DE UN PROTOBIONTE





La **diversificación de los autótrofos** fomentó el surgimiento de **heterótrofos** que pudieron vivir de los productos que los autótrofos excretaban o de los mismos autótrofos.



Algunas células por *selección*, pudieron utilizarlo para sus reacciones metabólicas, lo que dio lugar a la **respiración aerobia**: (nutrición heterótrofa aerobia)



- Aerobios obligados
- Anaerobios facultativos
- Anaerobios obligados

**Relación
metabólicas
con el oxígeno**



FOTOSÍNTESIS

Fijación y reducción
del CO_2 y para
fabricar las moléculas
orgánicas.




Los únicos procariontes fotosintéticos que generan O_2 son la
cianobacterias



FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA

atmósfera reductora  atmósfera oxidante

La aparición de la fotosíntesis es imprecisa




La cantidad de oxígeno atmosférico se incrementó de forma gradual desde hace 2.700 a 2.200 Ma.




Evolución Celular

EVOLUCIÓN CELULAR



Origen Eucariota






Los fósiles más antiguos **eucariotas**
tienen alrededor de 1.800 - 2.000 Ma.

Teoría **endosimbiótica (1970-1981)** Lynn Margulis
se originaron a partir de una primitiva célula **procariota**,
que perdió su pared celular, lo que le permitió aumentar de
tamaño

Esta primitiva **urcariota (1° eucariota ancestral)** en
un momento dado, englobaría a otras células
procarióticas, estableciéndose entre ambos una relación
endosimbionte.



La teoría más aceptada:
fusión biológica
por endosimbiosis
de al menos dos
organismos procariotas
diferentes: **una arquea y**
una bacteria






La **TEORÍA DE LA ENDOSIMBIOSIS** plantea que las mitocondrias y los plástidos fueron en un principio procariontes pequeños que vivían dentro de células más grandes

- ✓ Los ancestros propuestos para las mitocondrias son *procariontes heterótrofos aeróbicos*
- ✓ Los ancestros propuestos para los plástidos son *procariontes fotosintéticos*




A la célula primitiva **urcariota**, le proporcionó:

1- La capacidad de un **metabolismo oxidativo**, con lo cual la **célula anaerobia** pudo convertirse en **aerobia por selección**.



2- La posibilidad de realizar **la fotosíntesis** (autótrofo) capaz de utilizar como fuente de carbono el CO_2 para producir **moléculas orgánicas**.





La célula primitiva les proporcionaba a las **procariotas simbiontes**:

- ✓ un *entorno seguro* y
- ✓ *alimento para su supervivencia*

Se trataría de una **endosimbiosis** altamente ventajosa para los organismo implicados.

Todos ellos habrían adquirido particularidades metabólicas que no poseían por sí mismos separadamente.

Ventaja que sería seleccionada en el transcurso de la evolución




Los mitocondrias y cloroplastos contienen genes del ARNr que al ser ubicados en árboles filogenéticos quedan dentro de Bacteria

La evidencia de ARNr apoya la hipótesis endosimbiótica de Lynn Margulis para explicar el origen de **mitocondrias** y **cloroplastos** a través de la posición de dichas organelas en la filogenia universal.



Después de muchos años, aparecieron seres mas desarrollados.....



Multicelulares simples: Grupos de unicelulares que se juntan formando colonias, pero que aun no tienen autonomía.




Multicelulares complejos: con verdadera autonomía de ser vivo, ya que dependen de su unión como multicelular para sobrevivir.

Indicios de transición unicelular a multicelular

Área: Paleontología — lunes, 3 de mayo de 2021

Encuentran microfósiles que contiene dos tipos distintos de células, lo que podría ser el primer animal multicelular jamás registrado.



El descubrimiento de este nuevo fósil nos sugiere que la evolución de los animales multicelulares ocurrió hace al menos **mil millones de años** y que los primeros eventos anteriores a la evolución de los animales pudieron haber ocurrido en agua dulce, como lagos en lugar de en el océano».



(Ma)

**Gran sedimentación: vulcanismo,
glaciaciones**

1000

Primeros multicelulares

1300

Diversificación de eucariontes

2000

Primeras células eucariontes

Precámbrico

Gran actividad volcánica y erosión

2000

Divers. procariontes aeróbicos

2300

Aparición del oxígeno

3000

Divers. procariontes anaeróbicos

3500

1ª bacterias; bat. Fotosintetizadoras

3800

Comienzo de la evolución química

4300

Aparición de océanos y mares


4500


Origen de la tierra y sistema solar



EL ARBOL UNIVERSAL DE LA VIDA

Darwin 1859 *El
origen de las
especies*





4 Simbiosis del ancestro del cloroplasto con el ancestro de las plantas verdes

3 Simbiosis del ancestro de la mitocondria con el ancestro de los eucariontes

2 Posible fusión de una *bacteria* y una *arqueobacteria*, que produjo los ancestros de células eucariontes

1 Último ancestro común de todas las criaturas vivientes



3 DOMINIOS DE WOESE (1991)


- ✓ El **dominio Bacteria** incluye la mayor parte de los organismos procariontes (**bacterias y cyanobacterias**)
- ✓ El **dominio Archaea**, es un grupo muy diverso de organismos procariontes que habitan en una amplia variedad de ambientes
- ✓ El **dominio Eukarya**, está compuesto por todos los organismos que poseen células con un núcleo verdadero. Incluye organismos unicelulares, multicelulares, los protistas, los hongos, las plantas y los animales.



Bacteria

Archaea

Eukarya



LUCA

Videos Sugeridos:

https://www.youtube.com/watch?v=_Loq6OnPWWU

<https://www.youtube.com/watch?v=5A0IBsbSOSI>

<https://www.youtube.com/watch?v=KiGw0SmEeR0>

TP 2. ORIGEN DE FORMAS DE VIDA